



147704-004

NexGard®

Afoxolaner 2.27% p/p masticable para perros
COMPRIMIDOS MASTICABLES**Composición:**

Cada comprimido contiene: 2,27% p/p de Afoxolaner, Excipientes c.s.p. 1 comprimido

Antiparasitario oralMata pulgas, garrapatas y ácaros en perros.
Uso oral**USO VETERINARIO****Descripción:**

NexGard® (afoxolaner) está disponible en cuatro presentaciones de antiparasitarios masticables blandos con sabor de carne bovina para administración oral en perros adultos y cachorros, de acuerdo con su peso. Cada antiparasitario masticable está formulado para proporcionar una dosificación mínima de afoxolaner de 2,5 mg/kg.

Indicaciones de uso:**NexGard®** mata pulgas y garrapatas en perros adultos y cachorros con más de 8 semanas de edad, pesando como mínimo 2 kg de peso corporal. Es indicado para el tratamiento y prevención de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y tratamiento y control de garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*).**NexGard®** mata pulgas antes de que coloquen los huevos.

- Debe ser administrado una vez por mes;

- es altamente palatable;

- Tiene un rápido comienzo de acción contra pulgas. Su efecto se inicia 30 minutos después de la administración y alcanza 100% de eficacia en 8 horas;

- Controla rápidamente la reinfestación de pulgas adultas recién adquiridas y garrapatas por un mes.

NexGard® también está indicado en el tratamiento de la demodicosis (causada por *Demodex canis*) y sarna sarcóptica (causada por *Sarcoptes scabiei*).**Mecanismo de Acción:**

El afoxolaner es miembro de la familia de isoxazolininas. Su mecanismo de acción se basa en el bloqueo pre y pos-sináptico del pasaje de iones cloruro a través de las membranas celulares (por los neurotransmisores GABA). Una hiperexcitación prolongada inducida por el afoxolaner resulta en actividad descontrolada del sistema nervioso central y la muerte de insectos y ácaros. La toxicidad del afoxolaner es específica para los invertebrados, contribuyendo para el margen de seguridad en mamíferos.

Dosis, frecuencia, duración del tratamiento y modo de empleo:

La dosis recomendada es de 2,5 mg/kg una vez al mes, equivalente a 1 comprimido del tamaño adecuado de acuerdo al peso del perro.

Esquema de Dosificación:

Peso Corporal	Nombre del Producto	Número de comprimidos a administrar
2 a 4 kg	NexGard® 11,3mg	1
4,1 a 10 kg	NexGard® 28,3mg	1
10,1 a 25 kg	NexGard® 68mg	1
25,1 a 50 kg	NexGard® 136mg	1
Por encima de 50 kg	Administre la combinación adecuada de antiparasitarios masticables	

NexGard® es altamente palatable y puede ser ofrecido directamente al perro. Administrar el masticable de una manera que estimule al perro a masticarlo. No hay ninguna recomendación de régimen alimenticio para la administración de NexGard®, pudiendo ser ofrecido junto con el alimento o no. Debe tenerse cuidado para que el perro consuma la dosis completa, y los animales tratados deben ser observados por unos minutos para asegurar que una porción de la dosis no sea perdida o rechazada. Si se sospecha de que una porción de la dosis o la dosis completa se perdió o si se presenta vómito dentro de dos horas después de la administración, administrar una nueva dosis completa.

Pulgas y garrapatas: El tratamiento puede comenzar en cualquier momento del año. En las áreas donde las pulgas y/o las garrapatas son comunes durante todo el año, se recomienda que el tratamiento mensual continúe todo el año sin interrupción. **NexGard®** no es repelente, para matar pulgas y garrapatas, las mismas deben subir y ponerse en contacto con el animal protegido.Datos de estudios realizados en laboratorio y en campo demuestran que **NexGard®** mata a las pulgas antes de que consigan colocar huevos, evitando las infestaciones subsecuentes después del comienzo del tratamiento de las infestaciones por pulgas ya existentes.**IMPORTANTE:** Para minimizar la probabilidad de reinfestación por pulgas y garrapatas, se torna importante tratar todos los animales que conviven en el mismo entorno. Además, es necesario realizar también un control estratégico integrado del entorno, con productos

específicos, siguiendo las recomendaciones del fabricante. Las formas inmaduras presentes en el ambiente en el momento de la aplicación pueden continuar sus ciclos, aconteciendo reinfestación de los animales incluso después del tratamiento. Para más informaciones, consulte a su veterinario.

Enfermedades de ácaros:

Para el tratamiento de demodicosis administrar 1 comprimido una vez al mes hasta que los raspados cutáneos sean negativos en al menos dos meses consecutivos.

Para el tratamiento de sarna sarcóptica administrar 1 comprimido una vez al mes durante 2 meses.

Seguridad:

En un estudio de campo controlado, NexGard® fue utilizado concomitantemente con otros medicamentos, como vacunas, anti-helmínticos, antibióticos (incluyendo tópicos), esteroides, AINEs, anestésicos y anti-histamínicos. No se observaron reacciones adversas derivadas del uso concomitante de NexGard® con otros medicamentos. Estudios demostraron un amplio margen de seguridad en perros con 8 semanas de edad o más. En uno de estos estudios, se administró NexGard® por vía oral en cachorros de la raza beagle de 8 a 9 semanas de edad en 1, 3 y 5 veces la dosis de exposición máxima (6,3 mg/kg) por tres tratamientos cada 28 días, seguidos de tres tratamientos cada 14 días, para un total de seis tratamientos. No hubo efectos clínicamente relevantes relacionados al tratamiento en el examen físico, peso corporal, consumo de alimentos, patología clínica (hematología, bioquímica clínica o pruebas de coagulación), patología macroscópica, histopatología o pesos de órganos. La aparición de vómitos fue similar en el grupo tratado y en el grupo control.

Efectos adversos y reacciones adversas:

No se han presentado efectos adversos de gravedad en los estudios realizados, reacciones gastrointestinales leves (vómitos, diarreas), prurito, letargia o anorexia y signos neurológicos (convulsiones, ataxia y temblores musculares) han sido reportados en muy raras ocasiones. La mayoría de las reacciones adversas fueron espontáneas y de muy corta duración.

Contraindicaciones:

No utilizar en casos de hipersensibilidad al principio activo o los excipientes.

Cachorros con menos de 8 semanas de edad.

Advertencias y precauciones especiales de uso, interacciones y precauciones especiales para la disposición de producto sin utilizar o el material de desecho:

No administrar en perros que pesen menos del rango inferior indicado para cada presentación del producto.

Los parásitos necesitan comenzar a alimentarse una vez adheridos al huésped para quedar expuestos al Afoxolaner, por lo tanto, no puede descartarse el riesgo de transmisión de enfermedades transmitidas por parásitos.

No se evaluó el uso de NexGard® en perros en reproducción, preñez o lactantes. No usar en hembras durante la etapa de gestación y lactancia.

Utilice con precaución en perros con antecedentes de convulsiones.

No utilizar en forma concomitante con otros productos farmacéuticos.

Envases vacíos pueden ser descartados como residuo doméstico sin ninguna precaución especial. No eliminar los envases con restos de producto en el suelo o cursos de agua. Contactar a la empresa importadora o a empresas especializadas en la eliminación de residuos para recibir las recomendaciones en la disposición de productos vencidos o no utilizados.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.**Presentación:**

NexGard® está disponible en cuatro presentaciones de antiparasitarios masticables blandos con sabor de carne bovina: Nexgard® 11,3 mg, Nexgard® 28,3 mg, Nexgard® 68 mg y Nexgard® 136 mg. Los antiparasitarios masticables se venden en blísteres con 1, 3, 4 ó 6 unidades por blíster.

Condiciones de almacenamiento:

Mantener en lugar fresco y seco, entre 15°C y 30°C, protegido de la luz.

NO DEBE SER UTILIZADO POR LOS SERES HUMANOS. EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL CONSULTAR A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE.

VENTA BAJO RECETA MÉDICO VETERINARIA.


FABRICADO POR:

Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda, Fazenda São Francisco s/n Paulínia - SP - Brasil.

Importado y Distribuido por: Boehringer Ingelheim Ltda.

Av. Isidora Goyenechea 3000, piso 18, Las Condes, Santiago de Chile, bajo licencia de Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Alemania.

Nexgard® 11,3 mg	Reg. SAG N° 2291
Nexgard® 28,3 mg	Reg. SAG N° 2292
Nexgard® 68 mg	Reg. SAG N° 2293
Nexgard® 136 mg	Reg. SAG N° 2294

Call center: 800 261 008 / 222 640 000
(desde celulares)

h00-h02LhT

APROBADO
SAG
16 oct 2023

Code: 147704-004



Cancel And Replace: 147704-003

PRODUCT: INSERT NEXGARD

COUNTRY: CHILE (CH)

DIMENSIONS

mm =210 X300

inches =N/A

PKG-ES =5010

Colors Please use the official PANTONE®(P) matching system for an accurate color representation.

BLACK

CUT

Version A - 09 JAN 2020 - 16h30 - IL16000218
B - 03 FEB 2020 - changes

Paulínia

JP

RELEASE: 15/05/2020

NOTE FOR THE SUPPLIER:

N/A

Marketing approval:

Regulatory approval:

Additional approval: (if applicable)